

ДИНАМИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ СТАРЫХ ГЕНЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.

Банникова В.Д.1 Колотева А.В.2, Одинцова Г. В.2

1ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,

2 Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова – филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Актуальность: В XXI веке спектр препаратов антиэпилептической терапии значительно расширился, появились препараты новых, новейших групп, которые стали активно применяться в лечении пациентов с эпилепсией, что влияет на широту применения препаратов старых генераций во врачебной практике.

Цель: Изучить динамику применения антиэпилептических препаратов в XX и XXI веке.

Материалы и методы: В 2020 году на базе РНХИ им. проф А.Л. Поленова был исследован анамнез антиэпилептической терапии у 60 пациентов нейрохирургического профиля с фармакорезистентной эпилепсией в двух группах : 1 гр- пациенты с дебютом заболевания в XX веке (длительность заболевания более 20 лет) и 2 гр- пациенты с дебютом эпилепсии в XXI веке (длительность заболевания менее 20 лет). Проведено сравнение частоты применения препаратов старой генерации в группах, исследована динамика применения конкретных препаратов. Использовался метод описательной статистики.

Результаты: Количество пациентов в 1 группе 32, во 2 гр -28 человек соответственно. Соотношение м:ж в когорте= 1:1.Распределение по формам эпилепсии, частоте и типам приступов в группах не различались на момент по-

ступления в стационар. В 1 гр препараты старых генераций в анамнезе составили 61%, во 2 гр. - 42 %. Барбитураты составили 21% в 1 гр и 5% во 2 гр. Бензодиазепины составили 5% в 1 гр и 0 % во 2 гр. Вальпроаты составили 15,4% в 1 гр и 20% во 2 гр. Карбаазепины составили 15% в 1 гр и 15,5% во 2 гр.

Выводы: Наблюдается существенное снижение применения в терапии эпилепсии препаратов старых генераций в сравнении с препаратами новых групп в XXI веке, преимущественно за счет снижения применения баритуратов и бензодиазепинов. Вальпроаты и карбамазепины сохранили свои позиции в терапии эпилепсии в XXI веке.