

СЕЛЕКТИВНАЯ НЕВРОТОМИЯ МЫШЕЧНО-КОЖНОГО НЕРВА КАК ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СПАСТИЧЕСКОГО ПАРЕЗА

Курнухина М.Ю., Гусев А.А., Черebilло В.Ю.

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург

Введение. В большинстве развитых стран острое нарушение мозгового кровообращения занимает первое место среди причин стойкой утраты трудоспособности. Наиболее частой причиной инвалидизации данной категории пациентов являются двигательные нарушения, представленные спастическим парезом. Помимо двигательных нарушений, спастичность способствует возникновению болевых синдромов, связанных с артропатиями и формированием в паретичных мышцах миофасциальных синдромов. В настоящее время существуют различные методы лечения спастического пареза, выполнение селективной невротомии мышечно-кожного нерва – один из них.

Цель. Оценка изменений качества жизни у больных с постинсультным спастическим парезом в позднем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 10 больных с постинсультным спастическим гемипарезом, которым проводилось оперативное лечение – селективная невротомия мышечно-кожного нерва. Нами проводилась оценка спастичности (по шкале Ашворта) и качества жизни (с помощью специального опросника NeuroQoL).

Результаты. Нами выявлена значимая положительная динамика по шкале Ашворта ($p < 0,05$). По данным специального опросника NeuroQoL, в позднем послеоперационном периоде отмечено снижение по шкале ограничений движений, уменьшение выраженности болевого синдрома ($p < 0,05$). Нами выявлено улучшение показателей по эмоциональной шкале и увеличе-

ние общей оценки качества жизни пациентов через 6 месяцев после выполненного оперативного вмешательства ($p < 0,05$).

Выводы. Селективная невротомия мышечно-кожного нерва является одним из эффективных методов лечения спастического пареза.