

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С КРАНИОФАРИНГИОМАМИ ЗА 12 ЛЕТ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ АДАССА.

Марголин Э., Канданело К., Шариф Р.

Нейрохирургическое отделение Адасы – Университетского
медицинского центра, г. Иерусалим, Израиль

Краниофарингиома - редкая опухоль, встречающаяся с равной частотой у детей и взрослых. Данная опухоль приводит к гипоталамическим и зрительным нарушениям.

Метод: Нами были ретроспективно изучены данные пациентов, прооперированных в отделении с 2008 по 2020 годы.

Результаты: Было прооперировано 28 пациентов с краниофарингиомой. Среднее время наблюдения 40 месяцев. Среди них 16 взрослых и 12 детей. Аденоматозная краниофарингиома диагностирована у 25 пациентов, папиллярная у 3. Прооперировано с использованием микрохирургической техники 12 человек. У 5 пациентов была применена эндоскопическая техника. Грасс тотальное удаление при микрохирургической операции отмечено у 5 из 12 прооперированных. Грасс тотальное удаление при эндоскопической операции достигнуто у 4 из 5 пациентов. У 64% прооперированных наблюдалось улучшение зрительных функций. В послеоперационном периоде у 75% развился пангипопитуитаризм. У 30% развился несахарный диабет. Радиохирургия была проведена 15 пациентам с субтотальным удалением. Возврат опухоли был выявлен у 3 пациентов с грасс тотальным удалением и 4 пациентов с парциальным удалением, дополненным радиохирургией.

Выводы: Краниофарингиома – опухоль, приводящая к инвалидизации и требующая комплексного подхода к лечению. Эндоскопическая техника увеличивает вероятность полного удаления опухоли с минимизацией

вероятность повреждения значимых структур. Гросс тотальное удаление и отсутствие повреждений значимых структур улучшают шансы выживания. Применение радиохирургии в значительной мере улучшает прогноз.